

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA



**Platsul**<sup>®</sup>  
AEROSOL

Sulfadiazina  
de Plata

Uso tópico dérmico

#### FORMULA

Cada 100 ml contiene:

Sulfadiazina de Plata ..... 1gr  
Excipientes autorizados c.s.p. .... 100ml

#### EXCIPIENTES

Miristrato de Isopropilo, Dióxido de Sílice Coloidal, Etanol, 1, 1, 1, 2 - tetrafluoroetano (propelente 134 a).

#### ACCION TERAPEUTICA

Antibacteriano. Bactericida. Bacteriostático.

#### INDICACIONES

Aerosol de acción tópica, de uso externo, en quemaduras, escaras y heridas de cualquier origen y grado. Tratamiento antiséptico de afecciones dermatológicas infectadas o susceptibles de infectarse, quemaduras, úlceras, escaras por decúbito. Eficaz para el tratamiento contra gérmenes Gram-negativos, tales como Pseudomona aeruginosa (bacilo pioiciánico), Aerobacter aerogenes (enterobacter), Klebsiella pneumoniae (bacilo de Friedländer o bacilo de Neumann), Stafilococcus aureus.

#### CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS

##### Acción farmacológica

La Sulfadiazina de Plata posee acción antimicrobiana debido a la interacción con el ADN bacteriano, evitando el enrollamiento de la doble hélice en el curso de la replicación bacteriana. También tiene acción sobre la pared bacteriana.

##### Farmacocinética

La absorción de la Sulfadiazina de Plata, tanto en piel sana como con quemaduras superficiales y profundas es despreciable.

#### POSOLOGIA Y FORMA DE APLICACION

Agítese el envase antes de cada aplicación. Salvo mejor criterio médico, aplicar previo lavado y posterior secado de la lesión, una película de Platsul<sup>®</sup> aerosol de manera de cubrir toda la superficie de la herida a tratar. Pulverícese sobre las heridas una, dos o más veces por día.

#### CONTRAINDICACIONES

Sensibilidad franca local o general a las sulfamidas. Sensibilidad conocida a cualquiera de los componentes. Insuficiencia renal o hepática. Recién nacidos o prematuros.

No está recomendado el uso en el último trimestre del embarazo, el médico evaluará su utilización teniendo en cuenta la relación riesgo beneficio.

#### ADVERTENCIAS

No aplicar a recién nacidos o prematuros.

En pacientes con insuficiencia renal o hepática, evitar la aplicación sobre heridas abiertas.

#### PRECAUCIONES

No exponerse al sol. Los niños y ancianos son más propensos a presentar sensibilidad a los componentes.

##### Embarazo

Hasta la fecha no se han realizado estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. (Ver contraindicaciones).

##### Lactancia

Hasta la fecha se desconoce si la Sulfadiazina de Plata es excretada junto con la leche materna, el médico evaluará la conveniencia de discontinuar con el tratamiento o con la lactancia.

##### Interacciones

Se produce un efecto aditivo cuando se combina con agentes bacteriostáticos tipo Tetraciclina. Puede presentar un efecto antagonista cuando se suministra simultáneamente con antibióticos bactericidas. La administración de álcalis acelera la depuración metabólica renal de sulfadiazina.

#### REACCIONES ADVERSAS

En general Platsul<sup>®</sup> aerosol es muy bien tolerado y su aplicación resulta indolora. Raramente puede producirse hemólisis en pacientes con deficiencia de la glucosa-6-fosfato dehidrogenasa o eczema de contacto. Se han observado casos de leucopenia asociada al tratamiento. Ocasionalmente pueden producirse reacciones molestas, tales como prurito y ligero escozor.

#### SOBREDOSIFICACION

Aun no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6658

#### PRESENTACION:

Aerosol conteniendo 50 ml : Venta al público.

Conservar en lugar fresco. No congelar. Proteger de la luz solar directa y del calor excesivo. No perforar ni arrojar al fuego aún cuando aparentemente esté vacío.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCION Y VIGILANCIA MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MEDICA.**

Fecha de revisión prospecto: 10/99

Elaborado en Iberá 5055 - Buenos Aires - Argentina y en ruta 3 Km 44,720. Virrey del Pino - Pdo de la Matanza. Pcia de Buenos Aires.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD CERTIFICADO N° 43.940

Director Técnico: Silvio L. Gaguine-Farmacéutico

**soubeiran chobet s.r.l.**

Iberá 5055 - C1431AEI - Buenos Aires - República Argentina  
ESPECIALIDADES MEDICINALES DESDE 1912

21441-1