



nicozinc[®]

Zinc-Piridin-3-Carboxilato (Nicozinc[®]) 200 mg Comprimidos

FORMULA

Cada comprimido contiene:

Zinc-Piridin-3-carboxilato (NICOZINC[®]) 200 mg

Excipientes:

Gelatina, Acido esteárico, Estearato de Magnesio, Lactosa, c.s.p. 350 mg

ACCION TERAPEUTICA:

Por su radical piridil carboxílico, el producto tiene un efecto vasodilatador. Además, el aporte de zinc a dosis suficientes incrementa la acción de las metaloenzimas zinc-dependientes (anhidrasa carbónica, fosfatasa alcalina, aldolasa, alcohol dehidrogenasa, carboxipeptidasa, difosfopiridín-nucleótido-A.D.N.-polimerasa) lo que se refleja en un balance positivo de los metabolismos terminales proteicos e hidrocarbonados. Todo esto favorece los procesos de regeneración tisular y cicatrización. Vasodilatador periférico.

POSOLOGIA:

Salvo indicación médica, 2 a 3 comprimidos por día.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo y lactancia, úlcera gastroduodenal, estados hemorragíparos y diabéticos lábiles (menor tolerancia a la glucosa).

Insuficiencia cardíaca derecha con estenosis mitral.

PRECAUCIONES:

Casos de glaucoma y disfunción hepática: observar atentamente la tolerancia y evolución del tratamiento. Los pacientes que reciben medicación antihipertensiva del tipo adrenal-bloqueantes, pueden señalar efecto vasodilatador aditivo y producir hipotensión postural.

Conviene también evitar la ingestión simultánea de cítricos o bebidas ácidas, pues éstas aceleran la liberación del ácido nicotínico y la aparición de efectos de vasodilatación y enrojecimiento cutáneo, lo que a veces es molesto para el enfermo.

EFFECTOS COLATERALES:

Raramente, aún con dosis altas, pueden observarse enrojecimiento cutáneo transitorio, llamaradas de calor, prurito, efectos que rara vez alcanzan niveles indeseables para discontinuar la administración.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Se debe evitar la ingestión simultánea de medicamentos que contengan fitatos y etilendiaminotetracético, pues éstos actúan como secuestrantes del zinc y anularían en gran parte su acción.

PRESENTACION:

Envases conteniendo: 20 y 50 comprimidos. Venta al público.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE
SALUD CERTIFICADO N° 36.274

Director Técnico: Silvio L. Gaguine-Farmacéutico

soubeiran chobet s.r.l.

Iberá 5055 - C1431AEI - Buenos Aires - República Argentina

ESPECIALIDADES MEDICINALES DESDE 1912