



veraldid®

Trihidroxietilrutósido 250 mg
 Ascorbato de magnesio 150 mg
 Comprimidos de acción prolongada

Fórmula:

Cada comprimido contiene:

Trihidroxietilrutósido (troxerutina) 250 mg
 Ascorbato de magnesio 150 mg

Excipientes:

Cera carnauba, Acido Estéarico, Anhídrido Silícico, Sulfato de Sodio, Talco, Silicato de Calcio, Almidón c.s.p. 710 mg.

Acción Terapéutica:

Flebotrópico. Antivaricoso.

Indicaciones:

Tratamiento de las manifestaciones funcionales relacionadas a la insuficiencia venosa de los miembros inferiores (pesadez en las piernas, dolor, edema, hormigueos, calambres nocturnos). Tratamiento de las manifestaciones funcionales de las crisis hemorroidales

Características farmacológicas

Acción farmacológica

Su acción se basa esencialmente en la estabilización de la permeabilidad de las paredes vasculares y capilares, esto contribuye a aumentar la resistencia y normalizar la permeabilidad de la microcirculación. Está indicado en el tratamiento de los problemas circulatorios de origen venoso y dolores varicosos de las piernas.

Farmacocinética

La troxerutina se absorbe en el tracto gastrointestinal. Después de una dosis única de 900 mg. en forma de comprimidos se obtiene un pico plasmático de 136 ng/ml a las 2 horas. La vida media es de 5,5 horas. La eliminación es por vía biliar sin cambios o conjugada con el ácido glucurónico

Posología:

1 a 3 comprimidos al día antes de las principales comidas.

Contraindicaciones:

Está contraindicado en presencia de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Niños. Embarazo. Lactancia. Lesiones digestivas en actividad. Insuficiencia hepática o renal severas. Trastornos capilares.

Precauciones y advertencias:

Se recomienda no administrar junto con antiácidos, hierro y taninos ya que pueden interferir en la absorción del producto. En la crisis hemorroidal, la administración de VERALDID® no excluye el tratamiento específico de la patología anal. El tratamiento debe ser de corta duración. Si los trastornos hemorroidales no ceden en algunos días, es indispensable consultar con el médico y, posiblemente, se deba suspender el tratamiento y realizar un estudio proctológico. En caso de hemorroides sangrantes descartar que éstas no se encuentran enmascarando alguna otra patología de mayor complejidad. Si los síntomas de pesadez de piernas o edema de miembros

inferiores persisten o empeoran luego de 1 o 2 semanas de tratamiento, consulte a su médico. Si repentinamente aparecen molestias inusualmente intensas en las piernas, con edema, decoloración de la piel, sensación de tensión o calor así como dolores, recurrir inmediatamente al médico. En los trastornos de la circulación venosa, es importante asociar el tratamiento con medidas higiénicas tales como evitar el exceso de peso, no permanecer mucho tiempo de pie, evitar la exposición prolongada al sol y calor.

Embarazo y lactancia:

No se recomienda su uso.

Empleo en pediatría:

El producto está indicado en patologías del adulto. No se recomienda su uso en este grupo etario.

Reacciones adversas:

Ocasionalmente puede producir trastornos gastrointestinales menores, cefaleas, rubor y alergia cutánea. Los mismos remiten espontáneamente o cuando se reduce la dosis o se discontinúa el tratamiento.

Interacciones:

Hasta el momento no se han encontrado interacciones con otros medicamentos.

Sobredosificación:

Aún no se han reportado casos en los que haya habido sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 4962-6666 Hospital A. Posadas: 4654-6658

Presentación:

Envases conteniendo 20 y 50 comprimidos: Venta al público. Conservar en lugar seco y fresco.

Mantener este y todos los medicamentos alejados del alcance de los niños.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE
 SALUD. Certificado N° 33.898

Director Técnico: Silvio L. Gaguine-Farmacéutico

soubeiran chobet s.r.l.

IBERÁ 5055 - C1431AEI - Buenos Aires - República Argentina
 ESPECIALIDADES MEDICINALES DESDE 1912